


Piranga Roja (*Piranga rubra*)



La **Piranga Roja** es un ave migratoria que se reproduce en Norteamérica. En Ecuador, suele encontrarse entre septiembre y marzo, en el interior de bosques, en sus bordes y claros, y en jardines, saltando de rama en rama, en la parte alta o media del follaje. Se alimenta de insectos, como avispas, abejas, moscas y escarabajos; los que suele atrapar en vuelo. Complementa su dieta con frutas pequeñas. Su nombre en Shuar es **Pichi Kapáku** y en Kichwa es **Chunda Pishku**. En inglés se llama **Summer Tanager**.



Acción: Siembra y cuida árboles de guayaba y parches de bambú.

Halcón Reidor (*Herpetotheres cachinnans*)




El **Halcón Reidor (Valdivia)** es un ave rapaz común en regiones tropicales de baja altura. Suele encontrarse al borde de bosques y caminos o en áreas con árboles dispersos, donde se posa sobre ramas expuestas, troncos o postes. Se alimenta de serpientes; pero si escasean, come roedores, otras aves y murciélagos. Aletea rápido y no planea. Su llamado parece una carcajada. Su nombre en Shuar es **Makantua** y en Kichwa es **Wastawai**. En inglés se llama **Laughing Falcon**.



Acción: Informa a tu comunidad que esta ave caza serpientes, ejerciendo un control de las mismas.

Martín Pescador Grande (*Megascyle torquata*)



El **Martín Pescador Grande** suele acechar su presa desde una rama de árbol o arbusto, o desde un tronco muerto o poste, al borde de ríos, lagos y arroyos. En la costa, también se observa sobre manglares. Se alimenta de peces de agua dulce o salada, los que acecha pacientemente e inmóvil, hasta que ve un pez cerca de la superficie y se lanza para atraparlo sin sumergirse. Su nombre en Shuar es **Charakta** y en Kichwa es **Tsalak Wally**. En inglés se llama **Ringed Kingfisher**.



Acción: Mantén los ríos y sus orillas cercanas a tu casa, limpios de plásticos.

Garrapatero Piquiliso (*Crotophaga ani*)




El **Garrapatero Piquiliso** suele encontrarse en pastizales, suelo, y follaje de tierras bajas y laderas tropicales. Se alimenta principalmente de insectos, como saltamontes, hormigas, abejas, moscas, orugas, escarabajos y mariposas. Además, come lagartijas y frutos pequeños, especialmente en época seca. Cooperan entre varios individuos al anidar y toman turnos para empollar. Su nombre en Shuar es **Mabie** y en Kichwa es **Wagra Pishku**. En inglés se llama **Smooth-billed Ani**.



Acción: Evita el uso de pesticidas para proteger su alimento.

Loro Cabeciazul (*Pionus menstruus*)




El **Loro Cabeciazul** se encuentra en bosques húmedos, densos, o con árboles más dispersos; puede verse también en cultivos de maíz, plátanos y arroz. Se alimenta de una gran diversidad de frutas, semillas y flores. En ocasiones, come tierra; probablemente para suplementar su dieta con minerales o ayudar a la digestión. Su nombre en Shuar es **Tuish** y en Kichwa es **Tuwish**. En inglés se llama **Blue-headed Parrot**.



Acción: Promueve el aprecio por los loros en libertad.

Soterrey Criollo (*Troglodytes aedon*)



El **Soterrey Criollo** suele encontrarse mientras busca alimento entre ramas de árboles y arbustos. Come arañas y varios tipos de insectos, como escarabajos, orugas, moscas y saltamontes. También come caparzones de caracoles, probablemente para suplir su dieta con calcio y ayudar su digestión. A veces, vuela bajo en áreas abiertas o salta rápido en el suelo mientras hurga. Su nombre en Shuar es **Purichak** y en Kichwa es **Llakta pishku**. En inglés se llama **House Wren**.



Acción: Permite que anide en tu comunidad.

Autillo Tropical (*Megascops choliba*)




El **Autillo Tropical** es nocturno y se encuentra en bosques, arboledas a lo largo de ríos, parques y jardines. Se alimenta de vertebrados, tales ranas, roedores, aves y murciélagos e invertebrados, tales lombrices, arañas, escorpiones e insectos. Si siente la presencia de un intruso en su nido, puede ponerse de espaldas sobre sus polluelos para defenderlos. Su nombre en Shuar es **Ambush** y en Kichwa es **Purtu Pucunchu**. En inglés se llama **Tropical Screech-Owl**.



Acción: Informa a tu comunidad que controla pequeños roedores e insectos en tu territorio.

Nictibio (*Nyctibius griseus*)



El **Nictibio (Puntepalo) Común** es un ave nocturna. Suele encontrarse en áreas boscosas con árboles dispersos, o al borde de bosques, ríos o caminos. Pasa el día sobre un tocón, rama expuesta o poste de cerco, donde se mimetiza por sus colores y postura. Se alimenta de insectos grandes, como polillas, saltamontes, chicharras y escarabajos, los que suele acechar desde una rama expuesta. Caza en vuelo. Su nombre en Shuar es **Auju** y en Kichwa es **lluku**. En inglés se llama **Common Potoo**.



Acción: Deja troncos secos erguidos para que pueda posarse y mimetizarse.

Mosquero Social (*Myiozetetes similis*)



El **Mosquero Social** se encuentra en áreas semiabiertas con árboles y setos vivos, orillas de bosques, cultivos y jardines. Es común encontrarlo en árboles frutales o parado en una rama expuesta, esperando a su próxima presa para lanzarse sobre ella en vuelo. Suele volar en pares o bandadas pequeñas. Se alimenta principalmente de insectos y frutas pequeñas. Su nombre en Shuar es **Piriris** y en Kichwa es **Chiripina**. En inglés se llama **Social Flycatcher**.



Acción: Disfruta de sus acrobacias, el ir y venir entre posarse en lo alto y cazar insectos al vuelo.

Tangara Paraíso (*Tangara chilensis*)



La **Tangara Paraíso** suele encontrarse en bandadas mixtas con otras especies de tangaras, en lo alto de los árboles y arbustos ricos en frutos. Cuando está en el follaje, es un ave muy activa, moviéndose frecuentemente de rama en rama, mientras busca alimento. Come frutas de diversos tamaños, e insectos, tales como larvas de moscas y saltamontes; también come arañas. Su nombre en Shuar es **Pichi** y en Kichwa es **Girguitu**. En inglés se llama **Paradise Tanager**.



Acción: Siembra árboles frutales propios de la región como la Colca.

Paloma Rojiza (*Patagioenas subvinacea*)



La **Paloma Rojiza** es pequeña y suele encontrarse en áreas boscosas, desplazándose por el follaje medio o alto de árboles y arbustos en busca de alimento. En ocasiones, se la encuentra en el suelo. Se alimenta de frutas diversas y puede andar solitaria, en pares o en bandadas de hasta 15 individuos. Su nombre en Shuar es **Yápankam** y en Kichwa es **Wastacuco**. En inglés se llama **Ruddy Pigeon**.



Acción: Protege a los guarumos (guarumbos) para que te deleite con su arrullo.

Amazonía **Guía de Aves** © 2023

La Amazonía ecuatoriana se extiende al este de la cordillera de los Andes hasta las fronteras orientales del país. Su relieve define dos zonas distintivas, la Alta Amazonía, que incluye el borde oriental de los Andes a menos de 1000 m s. n. m. (con algunas excepciones), y la zona de la Llanura Amazónica que no supera en promedio los 500 m s. n. m. Varios ríos importantes fluyen desde los Andes hacia las llanuras, algunos siendo afluentes del río Amazonas y navegables. La región se caracteriza por sus bosques húmedos tropicales y su exuberante biodiversidad en la que las aves se destacan por su variedad, belleza y cantos. Esperamos que esta guía de 16 especies de aves comunes, fáciles de identificar y representativas de diferentes tipos de hábitats, te sea útil para aprender más acerca de ellas y te anime a conocer más aves de tu región y el mundo. Esta guía es parte del material de apoyo del Manual de Actividades de Educación Ambiental *Celebremos las Aves del Ecuador*.

Para enterarte del manual y su uso, visita: <https://www.birds.cornell.edu/latam/celebremos-las-aves-de-ecuador/>

Descarga esta guía de aves, aquí: <https://www.birds.cornell.edu/latam/guia-de-aves-de-la-amazonia/>

Oropéndola Dorsirrojiza (*Psarocolius angustifrons*)




La **Oropéndola Dorsirrojiza** suele encontrarse en bandadas en el follaje de bosques, sus orillas y en arboledas. Se alimenta principalmente de frutas, como las papayas y naranjas. En ocasiones, consume néctar de las flores que encuentra en el follaje. Anida en grupo, formando colonias de varios nidos que construyen en árboles cercanos. Su nombre en Shuar es **Chuwi** y en Kichwa es **Manku**. En inglés se llama **Russet-backed Oropendola**.



Acción: Deja crecer palmas de chonta para que pueda construir su nido.

Chachalaca Jaspeada (*Ortalis guttata*)



La **Chachalaca (Guacharaca) Jaspeada** suele encontrarse en bosques poco densos y en sus bordes, parches boscosos, o en el follaje a lo largo de ríos y cultivos. Su alimento incluye frutas y flores que encuentra mientras se desplaza por el follaje. Rara vez se alimenta en el suelo. Se desplaza en grupos pequeños y ruidosos. Al anochecer, descansa con su grupo. Su nombre en Shuar es **Wakats** y en Kichwa es **Wataraku**. En inglés se llama **Speckled Chachalaca**.



Acción: Protégela para que tengas un buen despertador natural en la mañana.

Gallinazo Negro (*Coragyps atratus*)




El **Gallinazo Negro** es un ave monógama, que forma parejas duraderas a lo largo de los años. Se alimenta principalmente de carroña, la que localiza mientras vuela alto en las corrientes de aire tibio. Desde allí, puede detectar mejor los cadáveres, u otras aves carroñeras, a las que sigue para encontrar alimento. Además, suele husmear en la basura para alimentarse de desperdicios en descomposición. Su nombre en Shuar es **Chuank** y en Kichwa es **Illa wanka**. En inglés se llama **Black Vulture**.



Acción: Promueve el aprecio por este reciclador ambiental en tu barrio.

Garcilla Estriada (*Butorides striata*)



La **Garcilla Estriada** suele encontrarse solitaria en las orillas o vegetación alrededor de humedales, ríos, arroyos, pantanos, lagunas y cultivos de arroz. En la costa, se encuentra también en manglares. Su dieta es muy variada; come peces, salamandras, ranas, renacuajos, serpientes, lombrices e insectos, como grillos y larvas acuáticas. Además, come crustáceos, como cangrejos y camarones y pequeños roedores. Su nombre en Shuar es **Napi Unduru** y en Kichwa es **Chaja**. En inglés se llama **Striated Heron**.



Acción: Conserva la vegetación a orillas de humedales, esteros y lagunas.


Nuestros agradecimientos a **Daisy Valeria Utitaj Nunink, Luis Alberto Salagaje Muela, Cristina Teruel Vilar y Lou Jost**, por ayudar a elegir las especies de aves en esta guía para La Amazonía ecuatoriana. Diseño por Janet Menninger. Revisora externa: Eliana Montenegro.

Descarga gratis Merlin Bird ID y eBird Móvil en tu celular

Merlin Bird ID es una app gratuita para identificar aves y aprender acerca de ellas. Con sólo contestar cinco preguntas simples o usar una foto o audio, Merlin te ayudará a identificar tu ave de interés, encontrar su descripción, fotos, sonidos y su mapa de distribución. Con Merlin, tienes una guía para conocer más las aves de tu región y de otras partes del mundo. Además, puedes compartir tus observaciones con nosotros. Si te sientes seguro identificando aves en tu entorno, entonces, ¡**eBird Móvil** es para ti! Comparte y guarda tus observaciones de aves en eBird y ayudarás a entender y proteger las poblaciones de aves de todo el planeta.

Descarga Merlin Bird ID o eBird Móvil gratis desde App Store (iOS) o Play Store (Android), selecciona tu región de interés (paquetes) y ¡sal a pajarear!

Amazilia Gorgibrillante (*Chionomesa fimbriata*)



La **Amazilia Gorgibrillante** suele verse a en bordes de bosques, claros y en jardines. Evita el interior del bosque. Se alimenta principalmente del néctar de las flores en la parte baja y media de árboles, arbustos y hierbas. Además, come insectos como moscas y escarabajos. Es agresivo y defiende su territorio de otros colibrís. Su nombre en Shuar es **Jempe** y en Kichwa es **Curu Quindi**. En inglés se llama **Glittering-throated Emerald**.



Acción: Siembra plantas que produzcan flores y néctar, preferiblemente de forma tubular, colores llamativos y de la región.