

Elanio Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*)



El **Elanio Caracolero** es un ave rapaz especialista en caracoles de agua dulce. Suele encontrarse alrededor de humedales, pantanos, lagunas, lagos. A veces, alrededor de cultivos de arroz. Cuando los caracoles escasean, come peces pequeños, tortugas y cangrejos. Cuando atrapa un caracol, lo lleva sobre una rama o tronco, donde con su pico puntiagudo y fuerte lo abre y extrae su carne sin comer su caparazón. En inglés se llama **Snail Kite**.



Acción: Promueve la protección de esta ave evitando el uso de moluscicidas porque mata su alimento.

Halcón Reidor (*Herpetothes cachinnans*)




El **Halcón Reidor (Valdivia)** es un ave rapaz común en regiones tropicales de baja altura. Suele encontrarse al borde de bosques y caminos o en áreas con árboles dispersos, donde se posa sobre ramas expuestas, troncos o postes. Se alimenta de serpientes; pero si escasean, come roedores, otras aves y murciélagos. Es un ave que aletea rápido y no planea. Su llamado parece una carcajada. En inglés se llama **Laughing Falcon**.



Acción: Informa a tu comunidad que esta ave caza serpientes, ejerciendo un control de las mismas.

Martín Pescador Grande (*Megaceryle torquata*)




El **Martín Pescador Grande** suele acechar su presa desde una rama de árbol o arbusto, o desde un tronco muerto o poste, al borde de ríos, lagos y arroyos. En la costa, también se observa sobre manglares. Se alimenta de peces de agua dulce o salada, los que acecha pacientemente e inmóvil, hasta que ve un pez cerca de la superficie y se lanza para atraparlo sin sumergirse. En inglés se llama **Ringed Kingfisher**.



Acción: Mantén los ríos y sus orillas cercanas a tu casa, limpios de plásticos.

Tangara Azuleja (*Thraupis episcopus*)



La **Tangara Azuleja** suele encontrarse en pares o pequeñas bandadas al borde de bosques y arboledas, a lo largo de ríos y caminos, en cultivos y espacios abiertos o claros de bosque. Es común en parques y jardines; evita el interior del bosque. Se alimenta de frutas diversas, como también de arañas e insectos, como termitas, moscas y orugas. En ocasiones, consume el néctar de flores. También se conoce como **Azulejo**. En inglés se llama **Blue-gray Tanager**.



Acción: Instala bebederos de agua fresca y limpia lejos de tus mascotas para que beba y se bañe.

Cacique Lomiamarillo (*Cacicus cela*)




El **Cacique Lomiamarillo** se encuentra en el follaje a la orilla de bosques, caminos, ríos y arroyos y al borde de campos abiertos. Come insectos y otros artrópodos, como también frutas y néctar de las flores. Anida colectivamente. Las hembras tejen sus nidos cercanos en el follaje en forma de bolsas colgantes. Prefieren anidar cerca de un nido de avispas para proteger el área de depredadores. También se conoce como **Colemba**. En inglés se llama **Yellow-rumped Cacique**.



Acción: Siembra papayas en tu jardín y comunidad.

Soterrey Criollo (*Troglodytes aedon*)



El **Soterrey Criollo** suele encontrarse mientras busca alimento entre ramas de árboles y arbustos. Come arañas y varios tipos de insectos, como escarabajos, orugas, moscas y saltamontes. También come caparazones de caracoles, probablemente para suplir su dieta con calcio y ayudar su digestión. A veces, vuela bajo en áreas abiertas o salta rápido en el suelo mientras se alimenta. También se conoce como **Chawis**. En inglés se llama **House Wren**.



Acción: Permite que anide en tu comunidad.

Mochuelo del Pacífico (*Glaucidium peruanum*)




El **Mochuelo del Pacífico (Peruano)** es un búho pequeño, a menudo activo durante el día. Suele encontrarse en árboles, arbustos y matorrales altos en bosques, arboledas, alrededor de cultivos, laderas y poblados. A veces se percha sobre cables a lo largo de caminos. Se alimenta de insectos grandes, como cucarachas, orugas, polillas y escarabajos, como también de otras aves pequeñas y ranas. En inglés se llama **Peruvian Pygmy-Owl**.



Acción: Divulga su rol como controlador de insectos.

Garrapatero Piquiestriado (*Crotophaga sulcirostris*)




El **Garrapatero Piquiestriado** suele caminar o saltar en campos abiertos, pastizales, bordes de bosques y sobre matorrales o arbustos dispersos en tierras bajas y laderas. Se alimenta de insectos, como saltamontes, grillos, hormigas, abejas, orugas y mariposas. Además, come lagartijas y frutos pequeños. Anida en nidos comunales donde toman turnos para empollar. En inglés se llama **Groove-billed Ani**.



Acción: Promueve su rol importante para controlar las plagas del ganado, como las garrapatas.

Hornero Patipálido (*Furnarius leucopus*)




El **Hornero Patipálido** suele encontrarse caminando en el suelo o sobre ramas y troncos a lo largo de ríos, bordes de bosques, campos abiertos y claros. Se alimenta principalmente de insectos, como termitas, hormigas, escarabajos, orugas y grillos, como también de caracoles y cangrejos pequeños. En la época seca, se ha visto comiendo sapos y peces pequeños al borde de pozas poco profundas. También conocido como **Ollero**. En inglés se llama **Pale-legged Hornero**.



Acción: Informa a tu comunidad del dato curioso de esta ave, arquitecta de nidos de barro en forma de horno.

Tortolita Ecuatoriana (*Columbina buckleyi*)




La **Tortolita Ecuatoriana** suele encontrarse en pares o pequeñas bandadas en campos abiertos, zonas agrícolas, jardines, arboledas, matorrales y laderas. Se alimenta de pequeñas semillas. Construye su nido en forma de tazón firme, a diferencia de otras tortolitas que los construyen en forma plana y endeble. El nido lo construye en matorrales bajos y densos o sobre nudos de enredaderas. También conocida como **Tortolita Tierrera**. En inglés se llama **Ecuadorian Ground Dove**.

Acción: Recuerda que el alimento natural es más saludable; evita darles sobras de comida.



Perico Caretirrojo (*Psittacara erythrogenys*)



El **Perico Caretirrojo** es un ave social que es común encontrarlo en pares o bandadas de hasta varias decenas de individuos. Suele encontrarse en el follaje de árboles y arbustos, en el bosque seco, zonas boscosas, arboledas y a orillas de zonas agrícolas con árboles altos. Se alimenta de frutas, como mangos y de semillas y flores. Rara vez se le observa en el suelo. Suele anidar en cavidades de árboles grandes y viejos. También conocido como **Lora de Cabeza Roja**.

En inglés se llama **Red-masked Parakeet**.

Acción: Promueve apreciar su canto y colores en libertad. Recuerda que no son mascotas.



Andarríos Coleador (*Actitis macularius*)




El **Andarríos Coleador** es un ave playera que busca alimento a orillas de ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas y playas, como también en jardines. Come invertebrados terrestres y acuáticos de agua dulce y salada, como insectos de todo tipo, larvas, pequeños crustáceos, moluscos, lombrices y arañas. A veces come peces pequeños. Mientras camina y busca, mueve frecuentemente su cola de arriba a abajo. En inglés se llama **Spotted Sandpiper**.

Acción: Evita contaminar con detergentes o aceites las orillas de los ríos.



Tirano Tropical (*Tyrannus melancholicus*)



El **Tirano Tropical** prefiere áreas abiertas con algunos árboles o arbustos y agua; es común en parques y jardines. Suele encontrarse sobre una rama alta, desde donde se lanza a cazar su presa en pleno vuelo. Regresa a la misma rama para abatir su presa y comérsela. Come insectos, como avispas, abejas, escarabajos, saltamontes, libélulas, mariposas y polillas. A veces, come frutas pequeñas. También se conoce como **Azota Gavilán** porque suele acosar a gavilanes grandes. En inglés se llama **Tropical Kingbird**.

Acción: Disfruta de sus acrobacias, el ir y venir entre posarse en lo alto y cazar insectos al vuelo.



Gallinazo Negro (*Coragyps atratus*)



El **Gallinazo Negro** es un ave monógama, que forma parejas duraderas a lo largo de los años. Se alimenta principalmente de carroña, la que localiza mientras vuela alto en las corrientes de aire tibio. Desde allí, puede detectar mejor los cadáveres, u otras aves carroñeras, a las que sigue para encontrar alimento. Además, suele husmear en la basura para alimentarse de desperdicios en descomposición. También se conoce como **Buitre**. En inglés se llama **Black Vulture**.

Acción: Promueve el aprecio por este reciclador ambiental en tu barrio.



Garcilla Estriada (*Butorides striata*)



La **Garcilla Estriada** suele encontrarse solitaria en las orillas o vegetación alrededor de humedales, ríos, arroyos, pantanos, lagunas y cultivos de arroz. En la costa, se encuentra también en manglares. Su dieta es muy variada; come peces, salamandras, ranas, renacuajos, serpientes, pequeños roedores, lombrices e insectos, como grillos y larvas acuáticas. Además, come crustáceos, como cangrejos y camarones. También conocida como **Chuque**. En inglés se llama **Striated Heron**.

Acción: Conserva la vegetación a orillas de humedales, esteros y lagunas.



Nuestros agradecimientos a Nancy Hilgert de Benavides, Carola Bohórquez-Litardo, Carolina Bravo y Orlando Carrión, por ayudar a elegir las especies de aves en esta guía para la Costa ecuatoriana. Diseño por Janet Menninger. Revisora externa: Eliana Montenegro.


Descarga gratis Merlin Bird ID y eBird Móvil en tu celular

Merlin Bird ID es una app gratuita para identificar aves y aprender acerca de ellas. Con sólo contestar cinco preguntas simples o usar una foto o audio, Merlin te ayudará a identificar tu ave de interés, encontrar su descripción, fotos, sonidos y su mapa de distribución. Con Merlin, tienes una guía para conocer más las aves de tu región y de otras partes del mundo. Además, puedes compartir tus observaciones con nosotros. Si te sientes seguro identificando aves en tu entorno, entonces, ¡**eBird Móvil** es para ti! Comparte y guarda tus observaciones de aves en eBird y ayudarás a entender y proteger las poblaciones de aves de todo el planeta.

Descarga Merlin Bird ID o eBird Móvil gratis desde App Store (iOS) o Play Store (Android), selecciona tu región de interés (paquetes) y ¡sal a pajarear!



Amazilia Ventrirrufa (*Amazilia amazilia*)



La **Amazilia Ventrirrufa** es un colibrí común y fácil de encontrar en el bosque seco, entre matorrales, en poblados, jardines y parques. En ocasiones, se encuentra en los bordes de bosques costeros. Evita el interior de los bosques húmedos y densos. Se alimenta del néctar de las flores, insectos variados y arañas. Pasa casi el 80% de su tiempo perchado. Durante la época de lluvias, anida en arbustos de follaje denso. En inglés se llama **Amazilia Hummingbird**.

Acción: Siembra plantas de la región con flores que produzcan néctar, preferiblemente de forma tubular y colores llamativos.

