


Jilguero Encapuchado (*Spinus magellanicus*)




El **Jilguero Encapuchado** es un jilguero que suele encontrarse en grupos pequeños y ruidosos. Habita áreas abiertas con poca vegetación, campos agrícolas, matorrales, parques y jardines en pueblos y ciudades. Se alimenta de semillas que encuentra en el suelo o en la vegetación y de brotes de hojas. A veces, come insectos. Cuando construye su nido, lo hace sobre la parte más alta de un árbol alto. En inglés se llama **Hooded Siskin**.

Acción: Deja espacios de césped o pastos sin podar en tu jardín o potrero.



Picogrueso Dorado (*Pheucticus chrysogaster*)




El **Picogrueso Dorado (Huiracchuro)** es un picogrueso que suele encontrarse en bosques poco densos, al borde de bosques, terrenos con arbustos, cultivos con árboles dispersos y en áreas verdes de ciudades y pueblos. Se alimenta de semillas, frutos e insectos que captura en el follaje. Su pico grueso le permite romper semillas y frutos duros. Construye su nido en forma de tazón con ramitas sueltas y lo recubre con raíces finas en su interior. Cuando anida, su nido suele ser parasitado por la hembra del Vaquero Brillante. En inglés se llama **Golden Grosbeak**.

Acción: Siembra girasoles o maíz y déjalos secar.



Carpintero Dorsicarmesí (*Colaptes rivolii*)




El **Carpintero Dorsicarmesí** prefiere los bosques húmedos con presencia de musgos y líquenes. También suele encontrarse en áreas urbanas con árboles. Busca insectos, como orugas, hormigas, escarabajos, termitas y otros artrópodos como arañas y milpiés en ramas y troncos para alimentarse. También come frutas pequeñas que encuentra en el follaje. En inglés se llama **Crimson-mantled Woodpecker**.

Acción: Conserva los árboles viejos, muertos o gruesos que no sean un peligro, para que los carpinteros construyan sus huecos para anidar.



Tangara Azuliamarilla (*Rauenia bonariensis*)




La **Tangara Azuliamarilla** es una tangara que suele encontrarse en áreas semiabiertas con arboledas o arbustos dispersos, donde frecuenta posarse en ramas expuestas. Se alimenta de frutos e insectos, los que busca en árboles o arbustos tanto en la parte baja como en la parte alta del follaje. En el caso de los insectos, también los captura en vuelo. También se conoce como **Rigcha**. En inglés se llama **Blue-and-yellow Tanager**.

Acción: Siembra árboles que produzcan frutos como el Capulí.



Vaquero Brillante (*Molothrus bonariensis*)




El **Vaquero Brillante** suele encontrarse en el suelo en pastizales abiertos o asociado al ganado. A veces, puede verse sobre arbustos y árboles, donde duermen. Se alimenta de insectos, como escarabajos y grillos y otros artrópodos, como las arañas. También come semillas, granos y pastos. Se reproduce parasitariamente. La hembra pone sus huevos en los nidos de otras especies de aves para que se los empollen y alimenten a sus polluelos. En inglés se llama **Shiny Cowbird**.

Acción: Cuando veas un polluelo oscuro y grande siendo alimentado por un adulto de otra especie, puede ser un vaquero! Cuéntale a tu grupo.



Mirlo Grande (*Turdus fuscater*)



El **Mirlo Grande** es evidentemente grande. Suele encontrarse en áreas abiertas, matorrales, bordes de bosques, pastizales, arboledas, y en parques y jardines de pueblos y ciudades. Se alimenta principalmente de frutas, caracoles, lombrices e insectos. A veces, come flores, ratoncitos, lagartijas y polluelos de otras aves. Es más activo al amanecer y anochece, cuando se encuentra corriendo y saltando en el suelo. En inglés se llama **Great Thrush**.

Acción: Evita el uso de herbicidas en tu huerto o jardín.



Lechuza Campanaria (*Tyto alba*)




La **Lechuza Campanaria** es un ave rapaz nocturna. Suele encontrarse en una gran variedad de hábitats, aunque prefiere las áreas abiertas como praderas, campos agrícolas, áreas urbanas y zonas pantanosas. Se alimenta principalmente de roedores como ratas y ratones y de insectos como polillas. En ocasiones, también come aves pequeñas y reptiles. Duerme de día en cavidades naturales o en edificios. En inglés se llama **Barn Owl**.

Acción: Informa a tu comunidad que es de buen augurio encontrar una lechuza porque controla roedores y culebras en tu vecindario.



Cernícalo Americano (*Falco sparverius*)




El **Cernícalo Americano (Quilico)** es un halcón pequeño. Suele verse sobre cables o postes, y en áreas abiertas con pocos árboles. Se alimenta principalmente de insectos y otros invertebrados, así como de pequeñas aves y roedores. A veces, también come serpientes, lagartijas y ranas. Puede ocultar sus presas muertas para guardarlas temporalmente u ocultarlas de animales ladrones. En inglés se llama **American Kestrel**.

Acción: Deja las ramas de los árboles altos y frondosos crecer para que tenga donde posarse bajo la sombra.



Gallareta Púrpura (*Porphyrio martinica*)




La **Gallareta Púrpura** es un ave acuática que suele encontrarse en pantanos, humedales, y a orillas de lagos y lagunas. Prefiere las zonas con vegetación flotante, donde anida y busca alimento. Come semillas, pastos y frutos en la vegetación flotante o en las orillas. Además, come ranas, lombrices, caracoles e insectos. A veces, come polluelos de otras aves. En inglés se llama **Purple Gallinule**.

Acción: Si llega a tu jardín, previene que perros o gatos se le acerquen hasta que descanse y continúe su viaje migratorio.



Cerceta Aliazul (*Spatula discors*)




La **Cerceta Aliazul** es un pato migratorio pequeño que se reproduce en Norteamérica y en Ecuador, se encuentra entre octubre y febrero. Suele encontrarse en humedales, pantanos, lagos y lagunas. Se alimenta de invertebrados acuáticos, como larvas de insectos y caracoles; de algas, partes de vegetación acuática, semillas y en ocasiones de granos cultivados. Suele buscar alimento chapoteando con su pico sumergido en agua poco profunda. En inglés se llama **Blue-winged Teal**.



Acción: Recoge la basura en lagunas, ríos, humedales, arroyos y lagos.

Mosquero Bermellón (*Pyrocephalus rubinus*)



El **Mosquero Bermellón (Pájaro Brujo)** es un mosquero o atrapa moscas carismático. Suele encontrarse en bosques abiertos y áreas con malezas en áreas rurales y urbanas. A menudo se encuentra posado sobre postes a lo largo de carreteras. Se alimenta de insectos, como abejas, moscas, grillos, polillas y saltamontes. Suele atrapar sus presas en vuelo, las que acecha desde una rama expuesta. A veces, se encuentra en el suelo atrapando alguna presa. En inglés se llama **Vermilion Flycatcher**.



Acción: Evita el uso de pesticidas en tu huerta o jardín.

Sierra

Guía de Aves © 2023

La Sierra ecuatoriana se extiende sobre la cordillera de los Andes. Su relieve se divide en dos cordones montañosos, el occidental y el oriental, y un callejón interandino. En la Sierra hay montañas, volcanes y nevados, los cuales al entrelazarse forman valles con variados microclimas, lagunas y páramos. Su altura varía entre los 1800 y 6300 m s. n. m. (con algunas excepciones). Sus ríos nacen en sus montañas y páramos; algunos fluyen hacia la Costa y otros hacia la Amazonía. Sus variados micro-climas y alturas permiten zonas calurosas, templadas y frías, resultando en una biodiversidad en la que las aves se destacan por su belleza, cantos y variedad. Esperamos que esta guía de 16 especies de aves comunes, fáciles de identificar y representativas de diferentes tipos de hábitats, te sea útil para aprender más acerca de ellas, y te anime a conocer más aves de tu región y el mundo. Esta guía es parte del material de apoyo del Manual de Actividades de Educación Ambiental *Celebremos las Aves del Ecuador*.

Para enterarte del manual y su uso, visita: <https://www.birds.cornell.edu/latam/celebremos-las-aves-de-ecuador/>

Descarga esta guía de aves, aquí: <https://www.birds.cornell.edu/latam/guia-de-aves-de-la-sierra/>

Chingolo (Gorrion Criollo) (*Zonotrichia capensis*)




El **Chingolo (Gorrion Criollo)** es un gorrion muy movedizo. Suele encontrarse saltando en el suelo mientras busca semillas, invertebrados pequeños, como insectos para comer. También se encuentra cantando desde ramas expuestas o sobre rocas. Prefiere los espacios abiertos con cercos o matorrales. Es común en ciudades y pueblos. Cuando anida, su nido suele ser parasitado por la hembra del Vaquero Brillante. Es muy tolerante a la presencia humana. En inglés se llama **Rufous-collared Sparrow**.



Acción: Deja que hierbas y pastos crezcan en tu patio o macetas.

Tórtola Orejuda (*Zenaida auriculata*)



La **Tórtola Orejuda** es una paloma de amplia distribución en Sudamérica. Suele encontrarse en bandadas en áreas abiertas con árboles o arbustos dispersos, en matorrales, pastizales, campos agrícolas, pueblos y ciudades. Come semillas y granos, incluso de los cultivados, como el maíz, trigo, arroz y soya. Puede agruparse en bandadas de cientos de aves y en algunos países la consideran una plaga. En inglés se llama **Eared Dove**.



Acción: Pon agua en un recipiente plano en lo alto en tu patio para que beba y se bañe.

Gallinazo Negro (*Coragyps atratus*)



El **Gallinazo Negro** es un ave monógama, que forma parejas duraderas a lo largo de los años. Se alimenta principalmente de carroña, la que localiza mientras vuela alto en las corrientes de aire tibio. Desde allí, puede detectar mejor los cadáveres, u otras aves carroñeras, a las que sigue para encontrar alimento. Además, suele husmear en la basura para alimentarse de desperdicios en descomposición. También se conoce como **Buitre**. En inglés se llama **Black Vulture**.



Acción: Promueve el aprecio por este reciclador ambiental en tu barrio.

Golondrina Azuliblanca (*Pygochelidon cyanoleuca*)



La **Golondrina Azuliblanca** es una golondrina pequeña. Suele verse en bandadas en una variedad de hábitats, desde pueblos y ciudades a campos abiertos, sobre el agua o bosques. Se alimenta de insectos, especialmente de avispas pequeñas, hormigas aladas y abejas. También come escarabajos, moscas y polillas. Captura sus presas en vuelo. Para descansar, se posa en ramas expuestas o cables. En inglés se llama **Blue-and-white Swallow**.



Acción: Respeta y protege sus nidos para que controlen los mosquitos en tu comunidad.


Nuestros agradecimientos a **Daniel Arias Cruzatty, Gabriela Pazmiño Escobar, Jennifer Romero Velásquez, Tatiana Santander García**, por ayudar a elegir las especies de aves en esta guía para la Sierra ecuatoriana. Diseño por Janet Menninger. Revisora externa: Eliana Montenegro.

Descarga gratis Merlin Bird ID y eBird Móvil en tu celular

Merlin Bird ID es una app gratuita para identificar aves y aprender acerca de ellas. Con sólo contestar cinco preguntas simples o usar una foto o audio, Merlin te ayudará a identificar tu ave de interés, encontrar su descripción, fotos, sonidos y su mapa de distribución. Con Merlin, tienes una guía para conocer más las aves de tu región y de otras partes del mundo. Además, puedes compartir tus observaciones con nosotros. Si te sientes seguro identificando aves en tu entorno, entonces, ¡**eBird Móvil** es para ti! Comparte y guarda tus observaciones de aves en eBird y ayudarás a entender y proteger las poblaciones de aves de todo el planeta.

Descarga Merlin Bird ID o eBird Móvil gratis desde App Store (iOS) o Play Store (Android), selecciona tu región de interés (paquetes) y ¡sal a pajarear!

Orejivioleta Ventriazul (*Colibri coruscans*)



El **Orejivioleta Ventriazul**, también conocido como **Quinde Herrero**, es un colibrí grande y territorial que defiende agresivamente los parches de flores o bebederos para colibrís. Se encuentra en áreas abiertas con arbustos dispersos, en bordes de bosques o del páramo y en jardines con flores. Se alimenta del néctar de las flores y de insectos que atrapa en vuelo. Emite sonidos desde su percha como un herrero, de ahí su nombre. En inglés se llama **Sparkling Violetear**.



Acción: Siembra plantas de la región con flores que produzcan néctar, preferiblemente de forma tubular y colores llamativos.